

Examen de Maths 1

Exercice 1. (04 pts)

Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^n (3k^2 + k) = (3 \cdot 1^2 + 1) + (3 \cdot 2^2 + 2) + \cdots + (3n^2 + n) = n(n+1)^2.$$

Exercice 2. (8 pts)

I. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application définie par : $f(x) = \sqrt{1+x^2}$.

1. Calculer $f^{-1}(\{0\})$ et $f^{-1}(\{2\})$.
2. L'application f est-elle injective ? surjective ? bijective ?
3. Donner l'intervalle J pour que $f : [0, +\infty[\rightarrow J$ soit bijective ; puis déterminer l'application réciproque f^{-1} de f .

II. On définit sur \mathbb{R} la relation binaire \mathcal{R} par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x \mathcal{R} y \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

1. Montrer que \mathcal{R} est une relation d'équivalence.
2. Déterminer la classe d'équivalence $\sqrt{2}$.

Exercice 3. (08 pts)

I. Soient $a \in \mathbb{R}$ et g la fonction définie par

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 1 & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{\sin ax}{x} + x^2 - x & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

1. Déterminer a pour que g soit continue sur \mathbb{R} .
 2. a) Énoncer le Théorème des valeurs intermédiaires.
b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet au moins une solution sur $] -1, 0[$.
- II. 1. En utilisant le théorème des accroissements finis montrer que pour tous réels a et b avec $0 \leq a < b < 1$:

$$\frac{a-b}{\sqrt{1-b^2}} < \arccos b - \arccos a < \frac{a-b}{\sqrt{1-a^2}}.$$

2. En déduire que $\frac{\pi}{2} - \frac{5}{\sqrt{11}} < \arccos \frac{5}{6} < \frac{\pi}{2} - \frac{5}{6}$.

III. Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de $x_0 = 0$ de la fonction $f(x) = \frac{\arcsin x}{e^x}$.

Rappel : Au voisinage de 0 on a :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3), \quad \arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3).$$

Bon courage

Corrigé de l'examen de Maths 1

Exercice 1. (04 pts) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\mathcal{P}(n) : \sum_{k=1}^n 3k^2 + k = n(n+1)^2.$$

Pour $n = 1$, on a :

$$3 \cdot 1^2 + 1 = 4 \text{ et } 1 \cdot 2^2 = 4, \text{ donc } \mathcal{P}(1) \text{ est vraie.} \quad (1\text{pt})$$

Soit $n \geq 1$. On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie, c'est à dire

$$\sum_{k=1}^n 3k^2 + k = n(n+1)^2 \quad (1\text{pt})$$

et montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, c'est à dire

$$\sum_{k=1}^{n+1} 3k^2 + k = (n+1)(n+2)^2.$$

On a

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} 3k^2 + k &= \sum_{k=1}^n 3k^2 + k + 3(n+1)^2 + (n+1) & (1.5\text{pt}) \\ &= n(n+1)^2 + 3(n+1)^2 + (n+1) \\ &= (n+1)(n(n+1) + 3(n+1) + 1) \\ &= (n+1)(n^2 + 4n + 4) \\ &= (n+1)(n+2)^2, \end{aligned}$$

donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

D'où, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie. (0.5pt)

Exercice 2. (8 pts)

I. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application définie par : $f(x) = \sqrt{1+x^2}$

1. Calculons $f^{-1}(\{0\})$ et $f^{-1}(\{2\})$.

$$\begin{aligned} f^{-1}(\{0\}) &= \{x \in \mathbb{R} / f(x) \in \{0\}\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / f(x) = 0\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} / \sqrt{1+x^2} = 0\right\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / 1+x^2 = 0\} & (0.5\text{pt}) \\ &= \{x \in \mathbb{R} / x^2 = -1\} \\ &= \emptyset. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f^{-1}(\{2\}) &= \{x \in \mathbb{R} / f(x) \in \{2\}\} \\
&= \{x \in \mathbb{R} / f(x) = 2\} \\
&= \left\{ x \in \mathbb{R} / \sqrt{1+x^2} = 2 \right\} \\
&= \{x \in \mathbb{R} / 1+x^2 = 4\} \quad (0.5\text{pt}) \\
&= \{x \in \mathbb{R} / x^2 = 3\} \\
&= \{\sqrt{3}, -\sqrt{3}\}
\end{aligned}$$

2. Étudions l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de f .

(a) Injectivité de f : D'après la question précédente, on a

$$f(-\sqrt{3}) = 2 = f(\sqrt{3}) \text{ mais } -\sqrt{3} \neq \sqrt{3}. \text{ Donc } f \text{ n'est pas injective.} \quad (0.5\text{pt})$$

(b) Surjectivité de f : f n'est pas surjective car $y = 0$ (par exemple)

n'a pas d'antécédent (d'après la question précédente). (0.5pt)

(c) Bijectivité de f : f n'est pas bijective car elle n'est pas injective (ou bien car elle n'est pas surjective). (0.5pt)

3. Donnons l'intervalle J tel que $f : [0, +\infty[\rightarrow J$ soit bijective. (0.5pt)

Il est facile de vérifier que $f : [0, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[$ est une bijection.

$\forall x \in [0, +\infty[, \forall y \in J = [1, +\infty[$ on a

$$\begin{aligned}
y = f(x) &\iff y = \sqrt{x^2 + 1} \\
&\iff y^2 = x^2 + 1 \\
&\iff x^2 = y^2 - 1 \quad (1\text{pt}) \\
&\iff |x| = \sqrt{y^2 - 1} \quad (\text{car } y \geq 1) \\
&\iff x = \sqrt{y^2 - 1} \quad (\text{car on cherche } x \in [0, +\infty[).
\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
f^{-1} : [1, +\infty[&\rightarrow [0, +\infty[\quad (1\text{pt}) \\
y &\mapsto f^{-1}(y) = \sqrt{y^2 - 1}
\end{aligned}$$

II. On définit sur \mathbb{R} la relation binaire \mathcal{R} par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x\mathcal{R}y \iff f(x) = f(y).$$

1. Montrons que \mathcal{R} est une relation d'équivalence.

(i) Réflexivité de \mathcal{R} : Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme $f(x) = f(x)$.

Donc $x\mathcal{R}x$, d'où la réflexivité de \mathcal{R} . (0.5pt)

(ii) Symétrie de \mathcal{R} : Soient $x, y \in \mathbb{R}$, tels que $x\mathcal{R}y$, on a

$$x\mathcal{R}y \implies f(x) = f(y) \implies f(y) = f(x) \implies y\mathcal{R}x.$$

Donc $\forall x, y \in \mathbb{R}, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$, d'où la symétrie de \mathcal{R} . (0.5pt)

(iii) Transitivité de \mathcal{R} : Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$, tels que $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$, on a

$$\begin{aligned} \begin{cases} x\mathcal{R}y \\ \text{et} \\ y\mathcal{R}z \end{cases} &\implies \begin{cases} f(x) = f(y) \\ \text{et} \\ f(y) = f(z) \end{cases} \\ &\implies f(x) = f(z) \implies x\mathcal{R}z \end{aligned}$$

d'où la transitivité de \mathcal{R} . (1pt)

Conclusion : De i), ii) et iii), \mathcal{R} est une relation d'équivalence sur \mathbb{R} .

2. Déterminons la classe d'équivalence $\sqrt{2}$.

$$\begin{aligned} \overline{\sqrt{2}} &= \{x \in \mathbb{R} / x\mathcal{R}\sqrt{2}\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / f(x) = f(\sqrt{2})\} \quad (1pt) \\ &= \{x \in \mathbb{R} / \sqrt{1+x^2} = \sqrt{3}\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / x^2 = 2\} \\ &= \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\} \end{aligned}$$

Exercice 3. (08 pts)

I. Soient $a \in \mathbb{R}$ et g la fonction définie par

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{\sin ax}{x} + x^2 - x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1. Continuité de g sur \mathbb{R}

a) Continuité de g sur \mathbb{R}^* (1pt) :

g est continue sur \mathbb{R}^* car la fonction $x \mapsto x^2 + 4x + 1$ est continue sur \mathbb{R} , donc en particulier sur $] -\infty, 0[$, et la fonction

$x \mapsto \frac{\sin ax}{x} + x^2 - x$ est continue sur \mathbb{R}^* , donc en particulier sur $]0, +\infty[$.

Donc g est continue sur \mathbb{R}^* , $\forall a \in \mathbb{R}$.

b) continuité de g en 0 :

Pour que g soit continue en 0, il faut et il suffit que :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = g(0).$$

On a $g(0) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin ax}{x} + x^2 - x = \lim_{x \rightarrow 0^+} a \frac{\sin ax}{ax} + x^2 - x = a. \quad (0.5pt)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + 4x + 1 = 1. \quad (0.5pt)$$

Donc g est continue en 0 si et seulement si

$$\lim_{x \rightarrow 0}^> g(x) = \lim_{x \rightarrow 0}^< g(x) = g(0),$$

c'est à dire, si et seulement si $a = 1$.

Conclusion : g est continue sur \mathbb{R} si et seulement si $a = 1$. (0.5pt)

2. a. **Théorème des valeurs intermédiaires :** (1pt)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que

1. f est continue sur $[a, b]$,

2. $f(a) \cdot f(b) < 0$.

Alors

$$\exists x_0 \in]a, b[: f(x_0) = 0.$$

Et si de plus f est strictement monotone, alors le x_0 est unique.

b. Montrons que l'équation $g(x) = 0$ admet au moins une solution sur $] - 1, 0[$.

On a g est continue sur $] - 1, 0[$, et on a $g(0) = 1 > 0$, et $g(-1) = -2 < 0$, donc $g(-1) \cdot g(0) < 0$.

Alors par le théorème de valeurs intermédiaires, il existe au moins un réel $c \in] - 1, 0[$, tel que $g(c) = 0$. (1pt)

II. 1. On considère la fonction $h(x) = \arccos x$ sur $[a, b]$ avec $0 \leq a < b < 1$.

h est une fonction continue $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. (0.5pt)

Alors d'après le théorème des accroissements finis :

$$\exists c \in]a, b[: h(b) - h(a) = (b - a)h'(c)$$

ou encore

$$\exists c \in]a, b[: \arccos b - \arccos a = \frac{a - b}{\sqrt{1 - c^2}} \quad (0.5pt)$$

Or $a < c < b$, donc

$$\sqrt{1 - b^2} < \sqrt{1 - c^2} < \sqrt{1 - a^2}$$

Par suite :

$$\frac{1}{\sqrt{1 - a^2}} < \frac{1}{\sqrt{1 - c^2}} < \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}}$$

De plus, pour $a - b < 0$, on a

$$\frac{a - b}{\sqrt{1 - b^2}} < \frac{a - b}{\sqrt{1 - c^2}} < \frac{a - b}{\sqrt{1 - a^2}}$$

Par conséquent : $\forall a, b \in \mathbb{R}$ avec $0 \leq a < b < 1$ on a :

$$\frac{a - b}{\sqrt{1 - b^2}} < \arccos b - \arccos a < \frac{a - b}{\sqrt{1 - a^2}} \quad (1pt).$$

2. Il suffit d'écrire l'encadrement précédent pour $a = 0$ et $b = \frac{5}{6}$. (0.5pt)

III. Déterminons le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de $x_0 = 0$ de la fonction $f(x) = \frac{\arcsin x}{e^x}$.

Au voisinage de 0, on a :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3), \quad \arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3).$$

Pour calculer le DL du quotient $\frac{x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)}$, On effectue la division suivant les puissances croissantes.

D'où,

$$\frac{x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)} = x - x^2 + \frac{2}{3}x^3 + o(x^3). \quad (1pt)$$

Ainsi le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de $x_0 = 0$ de la fonction

$$f(x) = \frac{\arcsin x}{e^x} \text{ est } x - x^2 + \frac{2}{3}x^3 + o(x^3).$$