Acide

Gras

Groupe carboxyle

Chaîne carbonée (atomes de carbones et d'hydrogènes)

Structure d'un acide gras (saturé)

A

Acide gras saturé

Acide palmitique
C 16:0

Acide gras monoinsaturé

Acide oléique
C 18:1n-9

Acide gras polyinsaturé

Acide linoléique
C 18:2n-6**B**

Acide alpha-linolénique (C18:3n-3)

Acide eicosapentaénoïque (C 20:5n-3)

Triglycéride

Gangliosides

A

B

Key:

- Glucose
- Galactose
- GaNAC
- ◆ NeuAc
- Cer Ceramide

Cholestérol ($C_{27}H_{45}OH$)

La synthèse du cholestérol se déroule dans le **Foie**. Cet organe fabrique **80 %** du cholestérol de l'être humain.

Une molécule de cholestérol nécessite **18** molécules d'acétyl CoA.

Statines : *inhibiteurs compétitifs de l'HMG CoA réductase*. Ils sont utilisés en médecine pour diminuer le **taux du cholestérol dans le sang**.

Cholestérol et esters de cholestérol

Structure du cholestérol: un lipide amphiphile
comparaison à d'autres stérols

Cholestérol

Les stérols des organismes vivants ont en commun le noyau stérol

Ergostérol (champignons)

Stigmastérol (plantes)

Acétyl-Coenzyme A

Cholestérol et esters de cholestérol

Le cholestérol résulte d'un assemblage d'acétyl-CoA

Formation de mévalonate :
 l'HMG-CoA réductase est une cible pharmacologique
Car cette étape est irréversible

Rôles du cholestérol

- **Composant des membranes cytoplasmiques.**
- Précurseur de synthèse des **hormones stéroïdiennes** (glucocorticoïdes, estrogènes, progestérone, minéralocortocoides, androgènes).
- Précurseur de synthèse des **acides biliaires**. Ces derniers sont des composants de la bile qui jouent un rôle dans le catabolisme des lipides.
- **Précurseur de vitamine D3 (cholécalférol).**

Acides biliaires

acide glycocholique
 acide taurocholique⁽¹⁾

Figure 8-7. Structures de divers stéroïdes.

(1) Les acides glycodésoxycholique et taurodésoxycholique ont une structure identique, à ceci près qu'en position 7, il y a un H au lieu d'un OH.

Rôle des acides biliaires

- Forment des micelles
- Les propriétés détergentes des acides biliaires favorisent l'émulsification des graisses
- Émulsion = dispersion des lipides dans l'eau
- L'émulsification permet l'action de la lipase pancréatique et favorise l'absorption des lipides
- l'absorption des vitamines liposolubles (vitamines A, D, E et K) qui est liée à celle des lipides est favorisée par les acides biliaires

- Taurocholate
 - Taurochenodesoxycholate.
 - glycocholate
 - glycochenodesoxycholate.
- } Sels biliaires.

Origine des sels biliaires synthèse de novo

Cholestérol (origine endo et exogène)

CYP7A

Acides biliaires primaires:

- Acide cholique
- Acide chenodésoxycholique

FOIE

Excrétion biliaire
puis intestinale

Acides biliaires primaires

7-alpha-déshydroxylase

Acides biliaires secondaires:

- Acide lithocholique
- Acide désoxycholique

INTESTIN

Synthèse des acides biliaires

Acides biliaires secondaires

LUMIERE
INTESTINALE

PRIMAIRES

SECONDAIRES

Ac CHOLIQUE

Ac DESOXYCHOLIQUE

Ac CHENODESOXYCHOLIQUE

Ac LITHOCHOLIQUE

ACTION BACTERIES COLIQUES
DESHYDROXYLATION
DECONJUGAISON