Série de TD N°5 de Chimie 2

Exercice 1 (à faire en TD)

1. Soit les équilibres chimiques suivants :

Donner pour chaque équilibre chimique, les expressions de K_C et K_P .

2. La constante d'équilibre de la réaction suivante est $K_C = 0,04$ à $T = 500 \text{ K}$:

Dans un récipient de 5 litres, on introduit 0,2 moles de PCl_5 et 0,1 mole de PCl_3 . Calculer :

- La composition du mélange à l'équilibre. En déduire la pression totale dans le récipient à l'équilibre.
- Les pressions partielles des constituants à l'équilibre. En déduire la valeur de K_P à 500K.

Exercice 2 (à faire en cours)

L'enthalpie standard de la réaction suivante à 650°C , à une pression de 1 atm, est de 38 kJ/mol.

- Quelle est l'influence sur cette réaction :
 - Si on augmente la pression ?
 - Si on diminue la température ?
- La constante K_P de cet équilibre vaut 2 à 650°C . On part d'un mélange d'1 mole de CH_4 et d'1 mole de H_2 à 650°C sous une pression constante de 1 atm. Quelle est la composition du mélange gazeux à l'équilibre ?

Exercice 3 (supplémentaire)

Soit la réaction suivante :

- Donner l'expression de la constante d'équilibre relative aux pressions partielles.
- La réaction est-elle possible à 298 K ?
- Calculer la constante d'équilibre à 298 K.
- La constante d'équilibre vaut 11.3 à 490°C . Calculer ΔH_R° , si celle-ci ne varie pas avec la température.
- Est-il intéressant de travailler à 25 ou 490°C ? Pourquoi ?

Données : $\Delta G_f^\circ(\text{HCl})_g = -96.3 \text{ KJ/mol}$, $\Delta G_f^\circ(\text{H}_2\text{O})_g = -229 \text{ KJ/mol}$

Corrigé de la Série de TD N°5

Exercice 1

1. Soit les équilibres chimiques suivants :

2. a) Composition du mélange gazeux à l'équilibre :

Instant	$\mathbf{PCl_5(g)}$	$\mathbf{PCl_3(g)}$	$\mathbf{Cl_2(g)}$	total
Initial (t=0)	0,2 mole	0,1 mole	0 mole	0,3 mole
Equilibre	0,2 - ξ	0,1 + ξ	0 + ξ	0,3 + ξ

On a : $K_C = \frac{[PCl_3][Cl_2]}{[PCl_5]}$

Et on sait que: $[C]_i = \frac{n_i}{V} \Rightarrow K_C = \frac{\frac{n_{PCl_3}}{V} \cdot \frac{n_{Cl_2}}{V}}{\frac{n_{PCl_5}}{V}} = \frac{(0,1+\xi)(\xi)}{(0,2-\xi)} \cdot \frac{1}{V} = 0,04 \quad \text{où : } V = 5 \text{ litres}$

On aura une équation du second ordre suivante :

$$\xi^2 + 0,3\xi - 0,04 = 0$$

La résolution de cette équation donne $\xi = 0,1 \text{ moles}$, donc :

$$n_{PCl_5} = 0,2 - \xi = 0,1 \text{ moles}$$

$$n_{PCl_3} = 0,1 + \xi = 0,2 \text{ moles}$$

$$n_{Cl_2} = \xi = 0,1 \text{ moles}$$

Déduire la pression totale dans le récipient à l'équilibre

$$P_t V = n_t R T \Rightarrow P_t = \frac{n_t R T}{V} = 3,28 \text{ atm} \quad \text{où : } n_t = 0,3 + \xi = 0,4 \text{ moles}$$

b) Les pressions partielles des constituants à l'équilibre

$$P_i = x_i P_t = \frac{n_i}{n_t} P_t \Rightarrow P_{PCl_5} = P_{Cl_2} = 0,82 \text{ atm}$$

$$P_{PCl_3} = 1,64 \text{ atm}$$

Déduire la valeur de K_p à 500K

$$K_P = \frac{P_{PCl_3} \cdot P_{Cl_2}}{P_{PCl_5}} = 1,64 \text{ atm}$$

K_p peut être aussi calculée par la relation : $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_{\text{gaz}}}$

Exercice 2

1. a) Une augmentation de la pression va favoriser le sens 2 qui est celui minimisant le nombre de moles de gaz.
- b) Une diminution de la température va favoriser le sens exothermique correspondant dans cette réaction au sens 2.

2. Composition du mélange gazeux à l'équilibre :

	$\text{CH}_4(\text{g}) \leftrightarrow$	$\text{C}(\text{graphite})$	$2\text{H}_2(\text{g})$	total
t = 0	1 mole		1 mole	2 mole
équilibre	1 - ξ		1 + 2 ξ	2 + ξ

On a : $K_p = \frac{P_{\text{H}_2}^2}{P_{\text{CH}_4}}$

Sachant que : $P_i = x_i P_t = \frac{n_i}{n_t} P_t \Rightarrow P_{\text{H}_2} = \frac{1+2\xi}{2+\xi} P_t$
 $P_{\text{CH}_4} = \frac{1-\xi}{2+\xi} P_t$

Donc : $K_p = \frac{\left(\frac{1+2\xi}{2+\xi} P_t\right)^2}{\frac{1-\xi}{2+\xi} P_t} = \frac{(1+2\xi)^2}{(1-\xi)(2+\xi)} P_t = 2 \quad \text{où : } P_t = 1 \text{ atm}$

$\xi = 0,38$ moles (après résolution de cette équation du second ordre)

Donc à l'équilibre :

$n_{\text{H}_2} = 1 - \xi = 0,62$ moles

$n_{\text{CH}_4} = 1 + 2\xi = 1,76$ moles.

Exercice 3

1- l'expression de la constante K_p

On a :

$$K_p = \frac{P_{\text{Cl}_2}^2 P_{\text{H}_2\text{O}}^2}{P_{\text{HCl}}^4 P_{\text{O}_2}} \dots \dots \dots (1)$$

2- La réaction est possible à $T_0 = 298$ si $\Delta G_{(R, T_0)}^\circ < 0$

On a : $\Delta G_{(R, T_0)}^\circ = 2\Delta G_f^\circ(\text{H}_2\text{O})_g - 4\Delta G_f^\circ(\text{HCl})_g$, car $\Delta G_f^\circ(\text{Cl}_2)_g = \Delta G_f^\circ(\text{O}_2) = 0$

$\Delta G_{(R,T_0)}^\circ = -72.8 \text{ KJ} < 0$, donc la réaction est possible à 298 K

3- Calcul de la constante d'équilibre à 298 K

A l'équilibre on a : $\Delta G_{(R,T_0)}^\circ = -RT_0 \ln K_p \iff K_p = \exp\left(\frac{-\Delta G_{(R,T_0)}^\circ}{RT_0}\right)$

$$K_p = \exp\left(\frac{72.8 \cdot 10^3}{8.314 \times 298}\right) = 5.77 \cdot 10^{12}$$

4- Calcul de l'enthalpie de l'équilibre (ΔH_R^0) à $T_1 = 490 \text{ }^\circ\text{C}$, si celle-ci ne varie pas avec la température

D'après la loi de Van'T Hoff on a : $d \ln K_p = \frac{\Delta H_R^\circ}{R} \cdot \frac{dT}{T^2} \iff \int_{K_p(T_0)}^{K_p(T_1)} d \ln K_p = \int_{T_0}^{T_1} \frac{\Delta H_R^\circ}{R} \cdot \frac{dT}{T^2}$

Sachant que ΔH_R° est indépendante de la température on aura donc :

$$[\ln K_p]_{K_p(T_0)}^{K_p(T_1)} = -\frac{\Delta H_R^\circ}{R} \left[\frac{1}{T}\right]_{T_0}^{T_1} \iff \ln K_p(T_1) - \ln K_p(T_0) = -\frac{\Delta H_R^\circ}{R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_0}\right]$$

$$\text{Donc: } \Delta H_R^0 = -R \left(\frac{\ln K_p(T_1) - \ln K_p(T_0)}{\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_0}\right)} \right)$$

À $T_1 = 763 \text{ K}$ on a : $K_p = 11.3$

À $T_0 = 298 \text{ K}$ on a : $K_p = 5.77 \cdot 10^{12}$

$$\text{D'où : } \Delta H_R^0 = -8.31 \left(\frac{\ln 11.3 - \ln 5.77 \cdot 10^{12}}{\frac{1}{763} - \frac{1}{298}} \right) = -109.60$$

Donc : $\Delta H_R^0 = -109.60 \text{ KJ}$

5- Il est plus intéressant de travailler à 298 K que de travailler à 763 K (490 °C) car

$K_p(763 \text{ K}) \lll K_p(298 \text{ K}) \iff$ Pression des produits à 298 K est supérieure à celle des produits à 763 K donc le nombre de mole des produits de la réaction à 298 K est plus important à celui de la réaction à 763K.