Séquençage de l'ADN

- ✓ Dresser un inventaire de l'ensemble des gènes d'un organisme (génomique)
- ✓ Étudier la fonction de ces gènes et leurs interactions
- ✓ Identifier et gérer les variations génétiques

Définition

Le séquençage de l'ADN, est la détermination de la succession des nucléotides le composant.

C'est aujourd'hui une technique de routine pour les laboratoires de biologie.

Cette technique utilise les connaissances qui ont été acquises depuis une trentaine d'années sur les mécanismes de la réplication de l'ADN.

Techniques de séquençage de l'ADN

Séquençage de Sanger

Frederick Sanger.
Prix Nobel de Chimie 1980

Séquençage de l'ADN

Technique de Sanger

Principe : méthode par synthèse enzymatique du brin complémentaire de l'ADN dont on cherche à déterminer la séquence à l'aide d'une ADN polymérase et de nucléotides « terminateurs de chaîne » **ddNTP** (didésoxyribonucléotides) qui ont un atome d'hydrogène à la place du groupement OH sur le carbone 3' du ribose.

Nécessite :

- ADN simple brin à séquencer
- ADN polymérase
- oligonucléotide amorce complémentaire
- 4 nucléotides dNTP
- dans 4 expériences différentes : chaque ddNTP

Le séquençage selon la technique de Sanger

Les ADN polymérase sont capables de synthétiser un brin complémentaire d'ADN, à partir d'un brin matrice.

Pour le séquençage des nucléotides légèrement différents sont utilisés: les didésoxyribonucléotides (**ddNTP**) au lieu des désoxyribonucléotides triphosphate (dNTP).

Les ddNTP diffèrent des dNTP par l'absence d'un groupement OH en position 3'. Ainsi lorsqu'une ADN polymérase utilise un ddNTP, elle n'est plus capable de rajouter le moindre nucléotide à sa suite : la synthèse du brin d'ADN s'arrête.

Deux types de nucléotides triphosphates

Séquençage de l'ADN

Technique de Sanger

désoxyribonucléosides triphosphates normaux précurseurs (dATP, dCTP, dGTP et dTTP)

petite quantité d'un didésoxyribonucléoside triphosphate (ddATP)

TCG
TAGCCTA
TATGTCT
TATCGAT
AATTTCAT
GTCCAT
TGGCT

la rare incorporation de didésoxyribonucléoside par l'ADN polymérase bloque la croissance de la molécule d'ADN

Séquençage de l'ADN

Technique de Sanger

Le protocole

Il faut préparer 4 mélanges:

- le fragment qui doit être séquencé
- un petit morceau d'ADN dont la séquence est complémentaire à l'extrémité 3' du fragment à séquencer = **amorçe**
- les 4 dNTP's (dCTP, dATP, dGTP, dTTP)
- l'ADN polymérase

Le protocole

Il faut préparer 4 mélanges:

- le fragment qui doit être séquencé
 - un petit morceau d'ADN dont la séquence est complémentaire à l'extrémité 3' du fragment à séquencer
 - les 4 dNTP's (dCTP, dATP, dGTP, dTTP)
 - l'ADN polymérase
 - dans chaque tube, de petites quantités d'un ddNTP fluorescent ou radioactif
- > son incorporation aléatoire stoppant la synthèse
- On obtient à la fin des réactions un ensemble de brins d'ADN de tailles variées, selon l'endroit où un ddNTP se sera inséré et que la réaction aura ainsi été stoppée

L'utilisation d'un ddNTP permet d'obtenir un ensemble de fragments d'ADN de différentes tailles, correspondant aux emplacements d'un nucléotide donné

NB synthèse du brin complémentaire, donc si arrêt par un ddGTP, c'est qu'il y a une Cytosine sur la séquence

dATP dCTP
dGTP ddGTP (un peu) dTTP

Conclusion :
de manière aléatoire, obtention d'un ensemble de fragments (de différentes tailles), arrêtés au niveau des Cytosines (complémentaires de G) du brin transcrit de l'ADN (donc des **Guanines** du brin codant).

Lecture de la séquence -séquençage "à la main"-

- Électrophorèse sur gel d'acrylamide.
- Détection des fragments d'ADN, soit en regardant la fluorescence, soit en exposant un film photographique au gel selon le marquage du ddNTP
- Suivant la taille des gels la séquence lue est limitée de 200 à 750 nucléotides environ

L'automatisation du séquençage

↑ Ajout des 4 ddNTP marqués par un fluorophore différent à la même réaction

Séquenceurs automatiques capables de réaliser les réactions de séquence, puis de les lire.

Une fois la réaction de séquence terminée, la taille des fragments obtenus est déterminée par une chromatographie. Le séquenceur détecte la fluorescence sortant des colonnes de chromatographie, repérant ainsi les fragments d'ADN et leur taille précise.

Séquençage de l'ADN

Technique de Sanger

Méthode de Maxam et Gilbert (Prix Nobel de Chimie 1980)

- ❖ Contrairement à la méthode de Sanger, celle-ci n'utilise quant à elle aucune base modifiée mais une réaction chimique permettant de couper le brin suite à un type de base.
- ❖ Moins facile à robotiser que la méthode de Sanger, utilise des produits chimiques toxiques → cette technique est aujourd'hui très peu utilisée dans les milieux industriels.

Maxam-Gilbert sequencing

Vers la nouvelle génération de Séquençage à haut-débit