

**Série de TD 1 d'Analyse 1**

**1ère Année ST**

Année universitaire 2025/2026

**Exo 1 :**

Soit  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x + 3 < 0\}$ .

1. Déterminer explicitement l'ensemble  $A$ .
2. Cet ensemble est-il borné ?
3. Donner  $\inf A$  et  $\sup A$ .
4. Dire si  $A$  possède un maximum ou un minimum.

**Exo 2 :**

On considère  $B = \left\{ \frac{2n+1}{n+2} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ .

1. Calculer les premiers termes.
2. Donner un majorant et un minorant de  $B$ .
3. Déterminer  $\inf B$  et  $\sup B$ .
4. L'ensemble  $B$  admet-il un maximum ? un minimum ?

**Exo 3 :**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $|2|x - 1| - 3| = 1$ .

**Exo 4 :**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $|x - 2| + |x + 1| \leq 4$ .

**Exo 5 :**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $E(2x) = E(x) + 1$ .

**Exo 6 :**

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $E(|x|) = 2|E(x)|$ .

## Série de TD 1 d'Analyse 1 — Corrigé

### 1ère Année ST

Année universitaire 2025/2026

#### Exo 1 :

Soit  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x + 3 < 0\}$ .

1. Factorisation :  $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$ . L'inégalité  $(x-1)(x-3) < 0$  est satisfaite pour  $1 < x < 3$ . Donc  $A = (1, 3)$ .
2.  $A$  est borné (inclus dans  $(1, 3)$ ).
3.  $\inf A = 1, \sup A = 3$ .
4.  $A$  est un intervalle ouvert donc il n'a ni minimum ni maximum.

#### Exo 2 :

$$B = \left\{ \frac{2n+1}{n+2} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

1. Premiers termes :  $n = 1 : 1, n = 2 : 5/4, n = 3 : 7/5, n = 4 : 3/2, \dots$
2. On observe (et on montre) que la suite  $a_n = \frac{2n+1}{n+2}$  est strictement croissante pour  $n \geq 1$ . Deux majorants possibles : 2 ou 3 par exemple. Un minorant : 1 (valeur pour  $n = 1$ ).
3. Limite :  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+2} = 2$ . Donc  $\inf B = a_1 = 1$  et  $\sup B = 2$ .
4. Le minimum existe :  $\min B = 1$  (atteint pour  $n = 1$ ). Le supremum 2 n'est pas atteint donc pas de maximum.

#### Exo 3 :

Résoudre  $|2|x-1| - 3| = 1$ .

Posons  $u = |x-1| \geq 0$ . L'équation devient  $|2u - 3| = 1$ . Ainsi  $2u - 3 = 1$  ou  $2u - 3 = -1$ , donc  $u = 2$  ou  $u = 1$ .

- Si  $|x-1| = 2$  alors  $x-1 = \pm 2$  d'où  $x = 3$  ou  $x = -1$ . - Si  $|x-1| = 1$  alors  $x-1 = \pm 1$  d'où  $x = 2$  ou  $x = 0$ .

$$x \in \{-1, 0, 2, 3\}.$$

#### Exo 4 :

Résoudre  $|x-2| + |x+1| \leq 4$ .

Étudions par intervalles délimités par  $-1$  et  $2$ .

- $x \leq -1$  : somme  $= -2x + 1 \leq 4 \Rightarrow -2x \leq 3$
- $-1 \leq x \leq 2$  : somme  $= 3 \leq 4$  — vraie pour tout  $x$  de l'intervalle.
- $x \geq 2$  : somme  $= 2x - 1 \leq 4 \Rightarrow 2x \leq 5 \Rightarrow x \leq 2,5$ . Intersection donne  $2 \leq x \leq 2,5$ .

Union des solutions :  

#### Exo 5 :

Résoudre  $E(2x) = E(x) + 1$ .

Notons  $k = \lfloor x \rfloor$ , donc  $x \in [k, k+1)$ .

Alors  $2x \in [2k, 2k+2)$  et  $\lfloor 2x \rfloor \in \{2k, 2k+1\}$ .

On veut  $\lfloor 2x \rfloor = k+1$ . Deux cas :

- Si  $\lfloor 2x \rfloor = 2k$  alors  $2k = k+1 \Rightarrow k = 1$ . Condition  $\lfloor 2x \rfloor = 2k$  équivaut à  $x \in [k, k+0,5)$ . Pour  $k = 1$  on obtient  $x \in [1, 1,5)$ .
- Si  $\lfloor 2x \rfloor = 2k+1$  alors  $2k+1 = k+1 \Rightarrow k = 0$ . Condition  $\lfloor 2x \rfloor = 2k+1$  équivaut à  $x \in [k+0,5, k+1)$ . Pour  $k = 0$  on obtient  $x \in [0,5, 1)$ .

En réunissant :  $x \in [0,5, 1,5)$ .

#### Exo 6 :

Résoudre  $E(|x|) = 2|E(x)|$ .

Étudions les cas  $x \geq 0$  et  $x < 0$ .

- Si  $x \geq 0$  alors  $|x| = x$  et  $E(|x|) = E(x)$ . De plus  $E(x) \geq 0$  donc  $|E(x)| = E(x)$ . L'équation devient  $E(x) = 2E(x)$  d'où  $E(x) = 0$ . Ainsi  $x \in [0, 1)$ .
- Si  $x < 0$  posons  $k = E(x)$ . Alors  $k \leq -1$  et  $x \in [k, k+1)$ . Pour  $x = k$  (point isolé) on vérifie à part : il n'y a pas de solution entière négative. Pour  $x \in (k, k+1)$  on a  $E(|x|) = \lfloor -x \rfloor = -k-1$  et  $2|E(x)| = -2k$ . L'équation  $-k-1 = -2k$  conduit à  $k = 1$  (impossible car  $k \leq -1$ ). Donc aucun  $x < 0$  n'est solution.

Conclusion :  $x \in [0, 1)$ .