Acides aminés

Plusieurs acides aminés jouent le rôle de neurotransmetteur dans le système nerveux. Cependant, **le glutamate, la glycine et le GABA** (acide gamma aminobutyrique) sont les principaux NTs.

Il existe une **coopération entre les neurones et la glie** pour la **synthèse et/ou l'élimination** de ces molécules, impliquées dans la transmission neuronale.

Acides aminés inhibiteurs

La répartition des **synapses GABAergiques** est ubiquitaire mais prédomine dans l'encéphale.

Les **synapses glycinergiques** sont mieux connues dans la moelle épinière.

Acides aminés excitateurs (AAE)

glutamate
aspartate

Acides aminés inhibiteurs (AAI)

GABA
glycine

Glutamate (Glu)

Synthèse : cytoplasme de la terminaison axonique.

La **glutaminase** et la **glutamine synthétase**, enzymes mitochondriales, sont nécessaires à la synthèse de ce neurotransmetteur.

Stockage : vésicule synaptique petite à centre clair.

Le Glu est stocké grâce à **GLUT (transporteur vésiculaire du glutamate)**. Ce dernier est situé sur la membrane cytoplasmique de la vésicule synaptique.

Elimination : transporteur spécifique (EAAT).

EAAT (transporteur des acides aminés excitateurs) existe sur la membrane cytoplasmique de la cellule présynaptique glutaminergique et la cellule gliale.

Réception : 11 récepteurs.

Récepteurs ionotropiques : 3 types.

Les noms des récepteurs ionotropiques viennent des agonistes qui les activent : **récepteur NMDA** (N-méthylD-aspartate), **récepteur AMPA** (amino-3-hydroxy-5 méthylisoxazole propionate) et **récepteur du kainate (acide kainique)**.

Récepteurs métabotropiques : Il en existe 8, répartis en 3 catégories.

-Récepteurs du groupe I (mGluR1 et mGluR5), couplés à la protéine Gq.

-Récepteurs du groupe II (mGluR2 et mGluR3), liés à la protéine Gs.

- Récepteurs du groupe III (mGluR4, mGluR6, mGluR7 et mGluR8), attachés à la protéine Gi.

Agonistes des recepteurs au Glutamate Synapse excitatrice

Terminaison
présynaptique

Glycine (glycocolle)

Synthèse : cytoplasme de la terminaison axonique à partir de la **sérine** grâce à la **sérine hydroxyméthyltransférase**.

Stockage : vésicule synaptique **petite à centre clair** grâce à **VIAAT** (transporteur vésiculaire des acides aminés inhibiteurs).

Élimination : **Transporteur de la glycine** (neurone présynaptique glycinergique et cellule gliale).

La **glycine** possède des **récepteurs ionotropiques pentamériques** qui **augmentent l'entrée des ions chlorures dans la cellule postsynaptique.**

Terminaison
présynaptique

Glucose
↓
Glutamate

Dégradation
du GABA

Cellule gliale

Décarboxylase à l'acide glutamique
et phosphate de pyridoxal

GAT

VIAAT

Récepteurs
du GABA

Cellule postsynaptique

GABA

Synthèse : cytoplasme de la terminaison axonique à partir de certains précurseurs : glutamate, alpha cétooglutarate, glucose et pyruvate.

Stockage : vésicule synaptique **petite à centre claire** grâce à VIAAT (**Vesicle inhibitory aminoacid transporter**).

Elimination : Transporteur de GABA (GAT : neurone présynaptique GABAergique et cellule gliale).

GABA : acide gamma-aminobutyrique

- La plupart des neurones inhibiteurs du cerveau utilisent le GABA ou la glycine (jusqu'à un tiers des synapses du cerveau utilisent le GABA)¹
- Le précurseur prédominant pour le GABA est le glutamate¹
- Le GABA est extrait de la synapse par des transporteurs spécifiques, et le GABA récupéré est métabolisé¹

- Le GABA est présent de façon diffuse dans tout le cerveau, au lieu d'être localisé dans des aires ou des voies spécifiques¹
- Il existe trois types de récepteur GABAergique, qui, bien que variés peuvent généralement être séparés de la manière suivante :¹
 - **GABA_A** : canal chlore ionotrope
 - **GABA_B** : récepteur métabotrope couplé aux protéines G
 - **GABA_C** : canal chlore ionotrope
- La glycine, l'autre neurotransmetteur inhibiteur majeur, a une distribution plus localisée, et peut être présente dans la moelle épinière¹

Les **récepteurs ionotropiques** $GABA_A$ et $GABA_C$ augmentent le flux (entrée) d'ions chlorures dans la cellule induisant une hyperpolarisation de la cellule postsynaptique.

Le **récepteur métabotrope** $GABA_B$ provoque la sortie massive des ions potassiques et le blocage des canaux calciques.

Anxiolytiques (exemple : diazépam=valium) : *agissent au niveau du récepteur du GABA de type A (entrée importante d'ions chlorure).*

LES BENZODIAZEPINES mécanisme d'action

- Fixation GABA:
 - GABA: Acide aminé inhibiteur majeur SNC
 - Augmentation conductance Cl⁻
 - Hyperpolarisation cellule post-synaptique
 - Diminution potentiels d'action
- Fixation BDZs (site allostérique):
 - Augmente la fréquence d'ouverture canal Cl⁻ en présence du GABA
 - Augmente Affinité et puissance du GABA
 - Mais pas son efficacité maximale

Anesthésie locale : perte de sensibilité au niveau du lieu d'administration par interruption de la conduction nerveuse.

Le mécanisme d'action des **anesthésiques locaux** est le *blocage des canaux sodiques*.

Anesthésie générale : provoque une perte de conscience et une absence de réactivité lors des stimulations douloureuses.

Les **anesthésiques généraux** potentialisent l'activité des **canaux de type inhibiteur (récepteur GABA de type A et récepteur de glycine)**.

Anesthésie générale

Substance anesthésique + morphinomimétique + myorelaxant

Tableau 1. CORRESPONDANCES ENTRE NEUROTRANSMETTEURS, FONCTIONS CÉRÉBRALES, MALADIES NEUROLOGIQUES OU MENTALES, ET CLASSES MÉDICAMENTEUSES

NEUROTRANSMETTEURS	FONCTIONS	MALADIES	CLASSES MÉDICAMENTEUSES
Dopamine	Plaisir Émotion Motricité	Psychose, Trouble bipolaire Maladie de Parkinson	Antipsychotiques Antiparkinsoniens
Noradrénaline	Vigilance Attention Humeur	Trouble de l'humeur Trouble anxieux Migraine	Antidépresseur Antimigraineux
Sérotonine	Humeur Prise alimentaire Émotion	Trouble de l'humeur Trouble anxieux Migraine	Antidépresseur Anxiolytique Antimigraineux
GABA	Émotion Activité neuronale	Trouble anxieux Épilepsie	Antiépileptique Anxiolytique
Glutamate	Motricité Mémoire Activité neuronale	Maladie d'Alzheimer Maladie de Parkinson Épilepsie	Anti-Alzheimer Antiparkinsoniens Antiépileptique
Acétylcholine	Mémoire Motricité	Maladie d'Alzheimer Maladie de Parkinson	Anti-Alzheimer Antiparkinsoniens

Epilepsie : Maladie caractérisée par un déséquilibre au niveau des synapses excitatrices et inhibitrices induisant une décharge hyperexcitatrice au niveau du cortex.

Antiépileptiques : contrôlent l'hyperexcitabilité neuronale.

- Blocage des canaux sodique et calcique (inhibition de la neurotransmission excitatrice postsynaptique).
- Augmentation de la transmission inhibitrice.

Propagation de
potentiel d'action

Terminal
présynaptique
excitateur

Carbamazepine, felbamate,
lacosamide, lamotrigine,
oxcarbazepine, phénytoïne,
rufinamide, topiramate,
valproate, zonisamide

Gabapentine
Pregabaline

Canal sodique
voltage dépendant

Dépolarisation

Vésicules

SV2A

Levetiracetam

Canal calcique

Felbamate

Topiramate

Glutamate

K^+

K^+

Récepteur
NMDA

Récepteurs AMPA
et Kainate

Ca^{2+} , Na^+

Na^+ (Ca^{2+})