- médiateur endocrine (hormone)
- médiateur paracrine
- ▲ neuromédiateur
- ★ médiateur autocrine

*récepteurs
aux
médiateurs*

-I.3 Classification des hormones

→ 3 classes chimiques

Les hormones sont classées en 3 principales catégories :

- Dérivés d'acides amines (noradrénaline, adrénaline, T3..)
- Polypeptides (insuline, glucagon...)
- Stéroïdes.

Toutes les **hormones stéroïdiennes** dérivent à partir du **cholestérol**.

Oestrogènes

Progestérone

Glucocorticoïdes

Minéralocorticoïdes

Androgènes

L'hypothalamus et l'hypophyse interviennent dans la synthèse de plusieurs hormones différentes.

Hypophyse :

- Anté-hypophyse (hypophyse antérieure)
- Post-hypophyse (hypophyse postérieure) : sécrète 2 nonapeptides (**ocytocine** et **ADH**)

L'**ocytocine** déclenche les **contractions utérines** lors de la parturition et **l'éjection du lait** lors de l'allaitement. Cette hormone déclenche la phosphorylation de la chaîne légère de myosine par la **MLCK (Myosin Light Chain Kinase)**.

ADH (hormone antidiurétique) = vasopressine : augmentation de la réabsorption de l'eau.

Il y a beaucoup d'hormones qui font partie de **l'axe hypothalamo-hypophysaire**.

Exemple1

Hypothalamus : GnRH (gonadolibérine)

Antéhypophyse : FSH, LH

Ovaires : Synthèse des oestrogènes et progestérone

Testicules :

LH : synthèse de testostérone (cellules de Leydig)

FSH : synthèse d'ABP (Androgen Binding Protein) par les cellules de Sertoli.

LH = Hormone lutéinisante ; FSH = Hormone de développement folliculaire

Exemple 2

Hypothalamus : **Corticolibérine** (CRH)

Antéhypophyse : **Corticotropine**

Corticosurrénale : **cortisol, corticostérone**

Cortisol & Corticostérone : glucocorticoides

Exemple 3

Hypothalamus : **Thyrolibérine** (TRH)

Antéhypophyse : **Thyrotropine** (TSH)

Glande thyroïde : **T3 et T4.**

T3 et T4 : Hormones thyroïdiennes

Hormones hypothalamiques

GnRH

Gonadolibérin:
Gonadotropin
Releasing
Hormone

LH, FSH

CRH

Corticolibérine:
Corticotropin-
Releasing
Hormone

ACTH

TRH

Thyrolibérine:
Thyrotropin-
Releasing
Hormone

T3, T4 PRL

GHRH

Somatolibérine
Growth
Hormone-
Releasing
Hormone

GH

GHIH

Somatostatine:
Growth
Hormone-
Inhibiting
Hormone

Anté-hypophyse

Hormones hypothalamiques

Post-hypophyse

Ocytocine

Muscles, organes

Hormone de croissance

Vasopressine (ADH)

Reins

LH

FSH

ACTH

TSH

Prolactine

Ovaires

Œstrogène
Progesterone

Testicule

Testostérone

Cortico-surrénale

Hormones corticoïdes

Thyroïde

Hormones thyroïdiennes

La sécrétion de la plupart des hormones antéhypophysaires et celle des releasing hormones hypothalamiques est soumise à un **rétrocontrôle** ou **feed-back négatif** exercé par les hormones périphériques sécrétées par leurs tissus cibles.

La testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire en réprimant l'expression du gène de GnRH.

La kisspeptine ou métastine est un neuropeptide codé par le gène *KISS1* qui se lie aux récepteurs couplés aux protéines G.

La kisspeptine intervient dans la régulation de la sécrétion en GnRH, augmentant la libération de cette dernière qui rétroagit en jouant sur la concentration en ARN messenger de *KISS1*.

Pré-pro-kisspeptine (145 aa)

∨ Clivage protéolytique

↓ Amidation

G Glycine à la position 122

RF - arginine et phénylalanine à l'extrémité C-terminale

GPR54

**hormone
stéroïde
(lipophile)**

**hormone
protéique**

hormone

Insuline : hormone peptidique hétérodimérique formée de chaîne A (21 aa) et d'une chaîne B (30 aa). C'est une hormone hypoglycémiante.

Insuline (+ = activation ; - = inhibition)

+ Glycolyse

+ Glycogénogenèse

- Glycogénolyse

+ Synthèse du cholestérol en activant HMG CoA réductase (forme active déphosphorylée).

Insuline

Extérieur

recepteur insuline
proteine tyrosine
coupled receptor
signal biochimique

JM

JM

β

β

TK

TK

IRS-1

Réponse
cellulaire

Transduction du signal

L'insuline possède un **récepteur** membranaire
à **tyrosine kinase**.

La liaison de l'insuline à l'une des 2 chaînes alpha de son récepteur entraîne sa transconformation qui active le domaine tyrosine kinase des chaînes bêta.

IRS = substrat du récepteur de l'insuline.

Glucagon

- Polypeptide de 29 acides aminés.
- Hormone hyperglycémiante.
- Sécrétion par les cellules alpha des îlots alpha de Langerhans du pancréas.

Période post-prandiale : inhibition de sécrétion de glucagon.

Période de jeûne : sécrétion de glucagon.

Glucagon : (+ = activation ; - = inhibition)

+ Glycogénolyse : favorise la **dégradation du glycogène** par activation de la **glycogène phosphorylase** (forme phosphorylée).

+ Néoglucogénèse : **synthèse de Glc (glucose)** à partir de **substances non glucidiques**.

+ Lipolyse : favorise le **catabolisme des lipides** par activation de la **triglycéride lipase** (forme phosphorylée).

- Glycolyse (diminution de l'activité de la **pyruvate kinase** et **phosphofructokinase**).

- Glycogénogénèse : **freine le catabolisme du glycogène** par inactivation de la **glycogène synthase**.

GH (somatotropine) = hormone de croissance

+ néoglucogenèse

+ lipolyse

+ synthèse protéique

La **prolactine** est l'objet d'une inhibition permanente, hormis les périodes de lactation, par l'hypothalamus. Cette glande synthétise des facteurs d'inhibition de prolactine (PIF) dont le principal est la dopamine.

La prolactine inhibe la sécrétion hypothalamique de FSH et LH, interrompant ainsi, au cours de la lactation, le cycle ovarien.

Angiotensinogène (Foie)

Rénine Sang

Angiotensine I

ACE

Angiotensine II (vasoconstriction)

Les **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** sont des médicaments qui sont utilisés dans le **traitement de l'hypertension artérielle**.

Hormones lipophiles

- Hormones thyroïdiennes (T3, T4)
- Hormones stéroïdiennes

Œstrogènes (18 C, 17 beta oestradiol, oestrone, estriol)

Progestérone (21 C)

Glucocorticoïdes (21 C, cortisol, corticostérone)

Minéralocorticoïdes (21 C, aldostérone)

Androgènes (19 C, testostérone)

Toutes les hormones stéroïdiennes dérivent à partir du **cholestérol** qui possède 27 carbones.

6 : CH

1,2... : CH₂

18,19... : CH₃

noyau stérol

chaîne acylée ramifiée

tête polaire

corps apolaire

Hormones stéroïdes
structure

cholesterol C27

cortisol C21

aldostérone C21

testostérone C19

estradiol C18

progesterone C21

P450_{scc} = cytochrome P450 side chain clivage

Voies de biosynthèse des hormones stéroïdes

cholestérol, précurseur dans la synthèse des hormones stéroïdes

4. Synthèse des estrogènes (C18)

- hydrogénation en C3
- perte du C19
- réarrangement phénolique cycle A

- 1 structure: **P450 aro** (gène = *CYP19A1*) = aromatase
- nombreux promoteurs géniques, régulations différentes en fonction du tissu (granulosa, placenta, ... testicule, +++ tissu périphériques)

les estrogènes dérivent des androgènes

Hormones stéroïdiennes

Œstrogènes

Œstradiol

C₁₈ H₂₄ O₂

Œstrone

C₁₈ H₂₂ O₂

Œstriol

C₁₈ H₂₄ O₃

Progestatifs

→ Progestérone

C₂₁ H₃₀ O₂

Androgènes

Testostérone

C₁₉ H₂₈ O₂

DHEA

C₁₉ H₂₈ O₂

Androstènedione

C₁₉ H₂₆ O₂

Dihydrotestostérone C₁₉ H₃₀ O₂

L'œstradiol (E2) est **l'œstrogène fort** car il se fixe avec une **grande affinité à son récepteur**.

L'œstriol exerce une faible activité œstrogénique et c'est la forme de dégradation de l'œstradiol et l'œstrone.

L 3 - 5 - 3' - 5' - Tétraiodothyronine ou thyroxine

L 3 - 5 - 3' - Triiodothyronine

Il existe une autre forme, 3, 3', 5'-de triiodothyronine qui est biologiquement inactive.

Une **hormone lipophile** possède un **récepteur intracytoplasmique (nucléaire)** monocaténaire à plusieurs domaines fonctionnels.

Les hormones lipophiles possèdent des récepteurs qui appartiennent à la **superfamille des récepteurs nucléaires** :

- **Récepteurs des hormones stéroïdiennes.**
- **Récepteurs de la vitamine D3 (cholécalférol).**
- **Récepteurs des hormones thyroïdiennes (T3, T4).**
- **Récepteurs de l'acide rétinique.**
- **Récepteurs orphelins.**

Les **dérivés naturels** de la vitamine A sont l'**acide rétinoïque** et son isomère l'**acide 9-cis-rétinoïque**¹. Ces molécules liposolubles influencent le développement embryonnaire chez plusieurs vertébrés via une action régulatrice sur l'expression de gènes cibles. Plus spécifiquement, ils jouent un rôle durant la gastrulation, l'organogénèse et la formation de tissus.

Figure III-2

Organisation générale des récepteurs nucléaires

- la région A/B est une région d'activation ou de modulation transcriptionnelle,
- la région C est la région de liaison à l'ADN ,
- la région D est une région jouant un rôle important dans la localisation nucléaire des récepteurs,
- la région E est la région de liaison du ligand mais est également une région de régulation transcriptionnelle et de dimérisation du récepteur,
- la région F n'est pas toujours présente et joue un rôle mal défini.

Fonction de transactivation ligand-indépendante AF-1

Fonction de transactivation ligand-dépendante AF-2

Présentation schématique de la structure des récepteurs nucléaires humains:

ER : récepteur des oestrogènes.

PR (B) : forme B du récepteur de la progestérone.

GR : récepteur des glucocorticoïdes.

MR : récepteur des minéralocorticoïdes.

AR : récepteur des androgènes.

VitD3R : récepteur de la vitamine D3.

RAR : récepteur de l'acide rétinoïque (trans).

RXR : récepteur de l'acide rétinoïque (cis).

TR : récepteur des hormones thyroïdiennes.

Les nombres indiquent les positions des résidus d'acides aminés aux frontières des différents domaines.

Human estrogen receptor alpha
Human estrogen receptor beta

MEMBRANE CELLULAIRE

CYTOPLASME

NOYAU

Stéroïde

Récepteur

"Activation"

Complexe

hormone-récepteur

Élément de réponse
à l'hormone (HRE)

Gène

ADN

(chromatine)

Transcription

ARNm

ARNm

Traduction

Protéine spécifique

Réponse métabolique

Aldostérone

B

Homodimer

Palindrome HRE

Heterodimer

Direct Repeat HRE

Monomer

Half Site HRE

Mécanisme d'action des hormones lipophiles

Etat inactif : Récepteur+ HSP (protéines de choc thermique)

Etat actif : Récepteur + Hormone (dissociation des HSP).

4 étapes : Phosphorylation, Dimérisation, Liaison à l'ADN, Action transcriptionnelle (activation ou inhibition de la transcription).

Action transcriptionnelle

Formation de complexe de préinitiation de la transcription

Récepteur+Hormone+facteurs de transcription+ARN polymerase II

⊞ = Consensus Steroid Receptor Amino-Acids

⊙ = Specific rER Amino Acids

□ P-box □ D-box

Domaine C (66 aa) = domaine conservé entre les espèces.

Le domaine C a deux doigts de zinc. Cet atome se lie à 4 cystéines.

Le **complexe hormone-récepteur** se lie à l'**ADN** au niveau de l'**élément de réponse à l'hormone (ERH = séquence Cis)**.

ERE = élément de réponse aux estrogènes

ERG = élément de réponse aux glucocorticoides

ERH = séquence palindromique

Récepteur nucléaire = protéine à doigt de zinc

Exemple d'activation ou d'inactivation des HT dans un type cellulaire qui exprime les désiodases de type 2 et 3

A**Complexe corépresseur** **B****Complexe coactivateur**

Les **récepteurs des hormones thyroïdiennes se fixent toujours à l'ADN** et non aux HSP. En absence de leurs ligands, ils se lient à des **corépresseurs** (Sin3A, SMRT, NCoR) pour empêcher la transcription de gène. Ces corépresseurs ont l'activité de **désacétyler les histones**.

Coactivateurs :

Acétylation des histones (activation de la transcription).

HAT : histone acetyltransfesase
HDAC : histone desacetylase

Oestrogènes

Les oestrogènes provoquent la stimulation de la transcription de plusieurs gènes :

- Stimulation de la transcription de gènes de cyclines (G1 à S : cycline A ; G2 à M : cycline B).
- Synthèse des protéines de blanc d'œuf (ovalbumine, conalbumine) dans l'oviducte de poule.
- Induction indirecte de la synthèse des protéines du jaune d'œuf (phosvitine, lipovitilines alpha et bêta). Le précurseur de ces protéines s'appelle vitéllogénine.
- Synthèse des récepteurs de la progestérone dans l'utérus.
- Induction de la synthèse du récepteur de la prolactine dans les glandes mammaires.

Progestérone

-**Entraîne** la formation des protéines du blanc d'œuf (avidine, ovomucoïde).

-**Provoque** la synthèse d'enzymes qui dégradent les couches cellulaires qui entourent l'ovule (impliquée dans l'ovulation : exemple (collagénase).

-**Inhibe la synthèse des récepteurs de l'ocytocine au niveau de l'utérus.**

-**Inhibe la synthèse des protéines du lait (caséines)) du milieu jusqu'à la fin de la gestation.**

-**Induit** la synthèse des protéines du blanc d'œuf (avidine, ovomucoïde).

- **Entraîne** la formation des récepteurs de la prolactine dans les glandes mammaires.

Testostérone

Les androgènes entraînent la synthèse d'enzymes (**aldose réductase, sorbitol deshydrogénase**) impliquées dans la formation du fructose dans les vésicules séminales. **Le liquide séminal contient 1 à 2 g/l de fructose.**

Glucocortocoides

- Ils sont **impliqués dans la synthèse des enzymes spécifiques de la néoglucogenèse** (pyruvate carboxylase, glucose 6 phosphatase, fructose 1, 6 biphosphatase, phosphoénolpyruvate carboxykinase).
- Ils sont **responsables de la synthèse de la glycogène synthase**).

Le cortisol joue plusieurs rôles dans l'organisme, et participe notamment :

- Au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines: il permet de réguler la glycémie en augmentant la synthèse de glucose par le foie (néoglucogenèse), mais aussi de stimuler la libération des lipides et des protéines dans la plupart des tissus
- A la réaction anti-inflammatoire.
- A la régulation de la pression artérielle.
- A la croissance osseuse.
- A la réponse au stress : le cortisol est souvent surnommé l'hormone de stress. Son rôle est d'aider l'organisme à y faire face, en mobilisant l'énergie nécessaire pour nourrir les muscles, le cerveau mais aussi le cœur.

Notons que le taux de cortisol varie en fonction des heures du jour et de la nuit : il est maximal le matin et diminue au long de la journée pour atteindre son niveau le plus bas le soir.

Hormones thyroïdiennes

Les hormones thyroïdiennes sont impliquées dans **l'activation de plusieurs gènes** (récepteur de LDL, enzymes de la néoglucogenèse, hormone de croissance, HMG CoA réductase et glucokinase).

Minéralocorticoïdes (effets non génomiques)

- Provoquent la rétention des ions Na^+ et la sécrétion de K^+ et H^+ par le rein.
- Induisent le transport des ions dans les glandes sudoripares (synthèse de la sueur).

L'aldostérone est une hormone minéralocorticoïde sécrétée par la zone glomérulée du cortex des glandes surrénales principalement en réponse à une stimulation par l'angiotensine 2 ou à une élévation de la kaliémie. Elle a un rôle crucial dans le maintien de la volémie plasmatique et de la tension artérielle, ainsi que de la kaliémie, via son action de réabsorption du sodium urinaire et de sécrétion de potassium dans l'urine, au niveau des tubes contournés distaux du rein. Elle est un composant majeur du système rénine-angiotensine-aldostérone.

La synthèse d'aldostérone est principalement activée par l'angiotensine II (système rénine-angiotensine-aldostérone), par le potassium, par l'ACTH, et l'endothéline 1.

L'aldostérone agit grâce à un récepteur spécifique, appelé récepteur minéralocorticoïde (MR), dont la fonction essentielle est la régulation de la balance hydro-sodée (réabsorption active de sodium et passive d'eau) et en conséquence de la pression artérielle qui lui est liée. **Ce récepteur est exprimé au niveau du tubule contourné distal du rein et régule directement l'expression des gènes codants les protéines qui contrôlent la réabsorption de sodium (Na^+) et l'élimination du potassium (K^+). Ces protéines sont principalement le canal épithélial à sodium (ENaC), et la pompe sodium-potassium.**