

Série de TD n°01 d'Algèbre 1
La théorie des ensembles et les relations binaires

Exercice 1.

1. On considère les ensembles :

$$B = \{x \in \mathbb{Z} / |x| < 3\}, E = \{x \in \mathbb{Z} / -5 < x \leq 5\} \quad \text{et} \quad A = E \cap \mathbb{N}^*$$

Déterminer les ensembles suivants :

$$A \cap B, \quad C_E^{(A \cup B)}, \quad A - B \text{ et } (A \cap B) \cap C_E^{(A \cap B)}.$$

2. Soient E un ensemble non vide et A, B, C et D quatre parties de E . Montrer que

- $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \subset C_E B$.
- $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$.
- $A \cap (B - C) = (A \cap B) \cap (A - C)$;

3. Soit $E = \{-1, 0, 1, 2\}$.

- Donner l'ensemble $E \times E$.
- Déterminer les ensembles $A = \{(i, j) \in E \times E / i < j\}$, $B = \{(i, j) \in E \times E / i > j\}$ et $C = \{(i, j) \in E \times E / i = j\}$.
- Montrer que A, B et C forment une partition de $E \times E$.

Exercice 2.

Soit $E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, et R la relation binaire définie sur E par :

xRy si et seulement si $x + y$ est pair.

- Dessiner le graphe représentatif de R .
- montrer que R est une relation d'équivalence sur E .
- Déterminer la classe de 0, et l'ensemble quotient E/R .

Exercice 3.

Dans \mathbb{R} on définit la relation binaire \mathcal{T} par :

$$\forall x, \quad y \in \mathbb{R}, \quad x\mathcal{T}y \iff \cos^2 x + \sin^2 y = 1$$

1. Montrer que \mathcal{T} est une relation d'équivalence.

2. Déterminer la classe d'équivalence de $\frac{\pi}{6}$.

Exercice 4.

1) Dans \mathbb{R} , on définit la relation binaire \mathcal{R} par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x \mathcal{R} y \iff x^2 - y^2 \leq x - y.$$

Montrer que :

- a) \mathcal{R} n'est pas symétrique.
- b) \mathcal{R} n'est pas antisymétrique.

2) On définit sur $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$ la relation binaire \mathcal{S} par :

$$\forall x, y \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[, x \mathcal{S} y \iff x^2 - y^2 \leq x - y.$$

a) Montrer que \mathcal{S} est une relation d'ordre.

b) Cet ordre est-il total ?

Exercice 5.

On définit sur \mathbb{N} la relation binaire \mathcal{R} suivante :

$$\forall x, y \in \mathbb{N} : x \mathcal{R} y \iff \exists n, m \in \mathbb{N}^* : y = nx^m.$$

1. Montrer que la relation \mathcal{R} est une relation d'ordre sur \mathbb{N} .

2. Cet ordre est-il total ?

Corrigé de la série de TD N°01 : Ensembles et relations binaires

Exercice n°1

1. On considère les ensembles :

$$B = \{x \in \mathbb{Z} / |x| < 3\}, E = \{x \in \mathbb{Z} / -5 < x \leq 5\} \quad \text{et} \quad A = E \cap \mathbb{N}^*$$

On détermine $A \cap B$. On a

$$\begin{aligned} B &= \{x \in \mathbb{Z} / |x| < 3\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} / -3 < x < 3\} \\ &= \{-2, -1, 0, 1, 2\} \end{aligned}$$

d'autre part, on a

$$E = \{x \in \mathbb{Z} / -5 < x \leq 5\} = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

donc

$$A = E \cap \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

ensuite

$$A \cap B = \{1, 2\}$$

On détermine : $C_E^{A \cup B}$.

$$C_E^{A \cup B} = \{x \in E / x \notin A \cup B\}$$

comme : $A \cup B = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, d'où

$$C_E^{A \cup B} = \{-4, -3\}$$

On détermine : $A \setminus B$.

$$A - B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus \{-2, -1, 0, 1, 2\} = \{3, 4, 5\}$$

On détermine : $(A \cap B) \cap C_E^{A \cap B}$:

$$(A \cap B) \cap C_E^{A \cap B} = \{1, 2\} \cap \{-4, -3, -2, -1, 0, 3, 4, 5\} = \emptyset$$

2. Soient E un ensemble non vide et A, B, C et D quatre parties de E .

a) Montrons que : $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \subset C_E B$.

On suppose que $A \cap B = \emptyset$ et on démontre que : $A \subset C_E B$.

Soit $x \in A$.

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow x \notin B \text{ car } A \cap B = \emptyset \\ &\Rightarrow x \in C_E B, \end{aligned}$$

donc $\forall x : x \in A \Rightarrow x \in C_E B$, d'où $A \subset C_E B$.

Alors, $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \subset C_E B$

b) Montrons que : $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$.

Soit $(x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D)$.

On a :

$$\begin{aligned} (x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D) &\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \text{ et } (x, y) \in (C \times D) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ et } y \in B) \text{ et } (x \in C \text{ et } y \in D) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ et } x \in C) \text{ et } (y \in B \text{ et } y \in D) \\ &\Leftrightarrow x \in A \cap C \text{ et } y \in B \cap D \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in (A \cap C) \times (B \cap D) \end{aligned}$$

Donc, $\forall (x, y) : (x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D) \Leftrightarrow (x, y) \in (A \cap C) \times (B \cap D)$.
 Alors, $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$.
 c) Montrons que $A \cap (B - C) = (A \cap B) \cap (A - C)$
 Soit $x \in A \cap (B - C)$, on a

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B - C) &\Leftrightarrow x \in A \text{ et } x \in (B - C) \\ &\Leftrightarrow x \in A \text{ et } (x \in B \text{ et } x \notin C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ et } x \in B) \text{ et } (x \in A \text{ et } x \notin C) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \text{ et } x \in (A - C) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A - C) \end{aligned}$$

Donc, $\forall x : x \in A \cap (B - C) \Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cap (A - C)$.
 Alors, $A \cap (B - C) = (A \cap B) \cap (A - C)$.

3 Soit $E = \{-1, 0, 1, 2\}$.

a) Donnons l'ensemble $E \times E$.

On a :

$$\begin{aligned} E \times E &= \{(x, y) / x \in E \text{ et } y \in E\} \\ &= \{(-1, -1), (-1, 0), (-1, 1), (-1, 2), (0, -1), (0, 0), (0, 1), \\ &\quad (0, 2), (1, -1), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, -1), (2, 0), (2, 1), (2, 2)\} \end{aligned}$$

b) Déterminons les ensembles A, B et C .

$$\begin{aligned} A &= \{(i, j) \in E \times E / i < j\} \\ &= \{(-1, 0), (-1, 1), (-1, 2), (0, 1), (0, 2), (1, 2)\} \\ B &= \{(i, j) \in E \times E / i > j\} \\ &= \{(0, -1), (1, -1), (1, 0), (2, -1), (2, 0), (2, 1)\} \\ C &= \{(i, j) \in E \times E / i = j\} \\ &= \{(-1, -1), (0, 0), (1, 1), (2, 2)\} \end{aligned}$$

c) Montrons que A, B et C forment une partition de $E \times E$.

On a :

1. $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$ et $C \neq \emptyset$.
2. $A \cap B = \emptyset, B \cap C = \emptyset$ et $A \cap C = \emptyset$.
3. $A \cup B \cup C = E$.

D'où A, B et C forment une partition de $E \times E$.

Exercice n°2 .

Soit $E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, et \mathfrak{R} la relation binaire définie sur E par :

$x \mathfrak{R} y \Leftrightarrow x + y$ est pair.

1. Le graphe représentatif de \mathfrak{R} : je vais vous l'envoyer en photo après

2. Montrons que \mathfrak{R} est une relation d'équivalence :

i. \mathfrak{R} est réflexive car on a $\forall x \in E, x \mathfrak{R} x$

$$0\mathfrak{R}0, 1\mathfrak{R}1, 2\mathfrak{R}2, 3\mathfrak{R}3, 4\mathfrak{R}4.$$


ii. \mathfrak{R} est symétrique car on a $\forall x, y \in E, x \mathfrak{R} y \Rightarrow y \mathfrak{R} x$

$$0\mathfrak{R}0 \Rightarrow 0\mathfrak{R}0$$

$$0\mathfrak{R}2 \Rightarrow 2\mathfrak{R}0$$

$$0\mathfrak{R}4 \Rightarrow 4\mathfrak{R}0$$

$$1\mathfrak{R}1 \Rightarrow 1\mathfrak{R}1$$



$$\begin{aligned}
 1R1 &\Rightarrow 3R1 \\
 2R0 &\Rightarrow 0R2 \\
 2R2 &\Rightarrow 3R2 \\
 2R4 &\Rightarrow 4R2 \\
 3R1 &\Rightarrow 1R3 \\
 3R3 &\Rightarrow 3R3 \\
 4R0 &\Rightarrow 0R4 \\
 4R2 &\Rightarrow 2R4 \\
 4R4 &\Rightarrow 4R4.
 \end{aligned}$$

iii. \mathcal{R} est transitive car on a $\forall x, y, z \in E, xRy$ et $yRz \Rightarrow xRz$.

$$\begin{aligned}
 0R0 \text{ et } 0R0 &\Rightarrow 0R0, 0R0 \text{ et } 0R2 \Rightarrow 0R2, 0R0 \text{ et } 0R4 \Rightarrow 0R4, \\
 0R2 \text{ et } 2R0 &\Rightarrow 0R0, 0R2 \text{ et } 2R2 \Rightarrow 0R2, 0R2 \text{ et } 2R4 \Rightarrow 0R4, \\
 0R4 \text{ et } 4R0 &\Rightarrow 0R0, 0R4 \text{ et } 4R2 \Rightarrow 0R2, 0R4 \text{ et } 4R4 \Rightarrow 0R4, \\
 1R1 \text{ et } 1R1 &\Rightarrow 1R1, 1R1 \text{ et } 1R3 \Rightarrow 1R3, \\
 1R3 \text{ et } 3R1 &\Rightarrow 1R1, 1R3 \text{ et } 3R3 \Rightarrow 1R3, \\
 2R0 \text{ et } 0R0 &\Rightarrow 2R0, 2R0 \text{ et } 0R2 \Rightarrow 2R2, 2R0 \text{ et } 0R4 \Rightarrow 2R4, \\
 2R2 \text{ et } 2R0 &\Rightarrow 2R0, 2R2 \text{ et } 2R4 \Rightarrow 2R4, 2R2 \text{ et } 2R2 \Rightarrow 2R2, \\
 2R4 \text{ et } 4R0 &\Rightarrow 2R0, 2R4 \text{ et } 4R2 \Rightarrow 2R2, 2R4 \text{ et } 4R4 \Rightarrow 2R4, \\
 3R1 \text{ et } 1R1 &\Rightarrow 3R1, 3R1 \text{ et } 1R3 \Rightarrow 3R3, \\
 3R3 \text{ et } 3R1 &\Rightarrow 3R1, 3R3 \text{ et } 3R3 \Rightarrow 3R3, \\
 4R0 \text{ et } 0R0 &\Rightarrow 4R0, 4R0 \text{ et } 0R2 \Rightarrow 4R2, 4R0 \text{ et } 0R4 \Rightarrow 4R4, \\
 4R2 \text{ et } 2R0 &\Rightarrow 4R0, 4R2 \text{ et } 2R2 \Rightarrow 4R2, 4R2 \text{ et } 2R4 \Rightarrow 4R4, \\
 4R4 \text{ et } 4R0 &\Rightarrow 4R0, 4R4 \text{ et } 4R2 \Rightarrow 4R2, 4R4 \text{ et } 4R4 \Rightarrow 4R4.
 \end{aligned}$$

(On est pas obligé de leurs écrire tout sur le tableau, mais on peut juste leurs expliquer sur le graphe que c'est une relation d'équivalence)

Finalement, de i, ii et iii, \mathcal{R} est une relation d'équivalence.

3. Déterminons la classe de 0, et l'ensemble quotient E/\mathcal{R} . On a :

$$\begin{aligned}
 \bar{0} &= \{x \in E, xR0\} \\
 &= \{x \in E, x+0 \text{ est pair}\} \\
 &= \{0, 2, 4\}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bar{1} &= \{x \in E, xR1\} \\
 &= \{x \in E, x+1 \text{ est pair}\} \\
 &= \{1, 3\}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bar{2} &= \{x \in E, xR2\} \\
 &= \{x \in E, x+2 \text{ est pair}\} \\
 &= \{0, 2, 4\} = \bar{0}.
 \end{aligned}$$

$$\bar{3} = \bar{1}, \text{ et } \bar{4} = \bar{0}.$$

d'où

$$E/\mathcal{R} = \{\bar{0}, \bar{1}\}.$$

Exercice n°3

Soit τ une relation définie sur l'ensemble \mathbb{R} comme suit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x\tau y \iff \cos^2 x + \sin^2 y = 1$$

1. Montrons que τ est une relation d'équivalence sur \mathbb{R} .

- Réflexivité de τ : Soit $x \in \mathbb{R}$. De la formule $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, on déduit que la relation est réflexive.
- Symétrie de τ : Soient $x, y \in \mathbb{R}$; $x\tau y$, alors on a :

$$\begin{aligned} \sin^2 x + \cos^2 x + \cos^2 y + \sin^2 y &= (\cos^2 x + \sin^2 y) + (\cos^2 y + \sin^2 x) \\ &= 1 + (\cos^2 y + \sin^2 x) \end{aligned}$$

mais, $\sin^2 x + \cos^2 x + \cos^2 y + \sin^2 y = 1 + 1 = 2$, d'où

$$\cos^2 y + \sin^2 x = 1$$

et donc τ est symétrique.

- Transitivité de τ : Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$: $x\tau y$ et $y\tau z$. Montrons que $x\tau z$. Si $x\tau y$ et $y\tau z$, on a :

$$\cos^2 x + \sin^2 y = 1 \text{ et } \cos^2 y + \sin^2 z = 1$$

ce implique

$$\cos^2 x + (\cos^2 y + \sin^2 y) + \sin^2 z = 2$$

d'où

$$\cos^2 x + \sin^2 z = 1$$

Donc τ est transitive. Finalement, de i, ii et iii, τ est une relation d'équivalence.

2. Déterminons la classe d'équivalence de $\frac{\pi}{6}$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\pi}{6}\right) &= \left\{x \in \mathbb{R} / x\tau \frac{\pi}{6}\right\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} / \cos^2 x + \sin^2 \frac{\pi}{6} = 1\right\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} / \cos^2 x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1\right\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} / \cos^2 x = \frac{3}{4}\right\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} / |\cos x| = \frac{\sqrt{3}}{2}\right\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} / \cos x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right\} \\ &= \left\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{\pi}{6} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\right\} \end{aligned}$$

Exercice n°4.

1) Dans \mathbb{R} , on définit la relation binaire \mathcal{R} par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x \mathcal{R} y \iff x^2 - y^2 \leq x - y.$$

a) Montrons que \mathcal{R} n'est pas symétrique :

On a : $0 \mathcal{R} 2$, car $0^2 - 2^2 = -4 \leq -2 = 0 - 2$. Mais, $2 \not\mathcal{R} 0$, car $2^2 - 0^2 = 4 > 2 = 2 - 0$.

b) Montrons que \mathcal{R} n'est pas antisymétrique :

On a $0 \mathcal{R} 1$ et $1 \mathcal{R} 0$, car

$$0^2 - 1^2 \leq 0 - 1 \text{ et } 1^2 - 0^2 \leq 1 - 0.$$

Mais $0 \neq 1$.

2) On définit sur $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$ la relation binaire \mathcal{S} par :

$$\forall x, y \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[, x \mathcal{S} y \iff x^2 - y^2 \leq x - y$$

a) Montrer que \mathcal{S} est une relation d'ordre.

i) Réflexivité de \mathcal{S} ? ($\forall x \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[, x \mathcal{S} x$) ?

Soit $x \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$. On a : $x^2 - x^2 = 0 = x - x$.

Donc, $x^2 - x^2 \leq x - x$.

Par la suite, $\forall x \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[, x \mathcal{S} x$.

D'où, \mathcal{S} est une relation réflexive.

ii) Antisymétrie de \mathcal{S} ? ($\forall x, y \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[, x \mathcal{S} y \text{ et } y \mathcal{S} x \implies x = y$) ?

Soient $x, y \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$. On suppose que $x \mathcal{S} y$ et $y \mathcal{S} x$ et on démontre $x = y$. On a

$$\begin{cases} x \mathcal{S} y \\ \text{et} \\ y \mathcal{S} x \end{cases} \implies \begin{cases} x^2 - y^2 \leq x - y \\ \text{et} \\ y^2 - x^2 \leq y - x \end{cases} \implies \begin{cases} x^2 - y^2 \leq x - y \\ \text{et} \\ x^2 - y^2 \geq x - y \end{cases}$$

Par la suite, $x^2 - y^2 = x - y$.

On a :

$$x^2 - y^2 = x - y \implies (x - y)(x + y - 1) = 0.$$

$$\implies \begin{cases} x = y \\ \text{ou} \\ x = 1 - y \text{ (impossible, car } x, y \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[) \end{cases}$$

Donc, $\forall x, y \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[, x \mathcal{S} y \text{ et } y \mathcal{S} x \implies x = y$.

D'où la relation \mathcal{S} est antisymétrique.

iii) Transitivité de \mathcal{S} : ($\forall x, y, z \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[, x \mathcal{S} y \text{ et } y \mathcal{S} z \implies x \mathcal{S} z$) ?

Soient $x, y, z \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$. On suppose $x \mathcal{S} y$ et $y \mathcal{S} z$ et on démontre $x \mathcal{S} z$.

On a :

$$\begin{cases} x \mathcal{S} y \\ \text{et} \\ y \mathcal{S} z \end{cases} \implies \begin{cases} x^2 - y^2 \leq x - y \\ \text{et} \\ y^2 - z^2 \leq y - z \end{cases} \implies x^2 - z^2 \leq x - z.$$

Donc, $\forall x, y, z \in \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[, x \mathcal{S} y \text{ et } y \mathcal{S} z \implies x \mathcal{S} z$.

D'où la relation \mathcal{S} est transitive

De (i), (ii) et (iii), on a \mathcal{S} est une relation d'ordre.
 b) Cet ordre est total.

En effet, soient $x, y \in]\frac{1}{2}, +\infty[$.

On a : $x^2 - y^2 \leq x - y$ où $x^2 - y^2 \geq x - y$.

donc, $x^2 - y^2 \leq x - y$ ou $y^2 - x^2 \leq y - x$.

d'où, $x \mathcal{S} y$ ou $y \mathcal{S} x$.

Alors, $\forall x, y \in]\frac{1}{2}, +\infty[: x \mathcal{S} y$ ou $y \mathcal{S} x$.

Exercice n°5. On définit sur \mathbb{N} la relation binaire \mathfrak{R} par :

$$\forall x, y \in \mathbb{N}, x \mathfrak{R} y \Leftrightarrow \exists n, m \in \mathbb{N}^* : y = nx^m$$

1. Montrons que \mathfrak{R} est une relation d'ordre.

• **Reflexivité** : Soit $x \in \mathbb{N}$. On a $x = 1x^1 \Rightarrow \exists(n = 1, m = 1) \in \mathbb{N}^* : x = nx^m \Rightarrow x \mathfrak{R} x$.

Donc $\forall x \in \mathbb{N}, x \mathfrak{R} x$, d'où la reflexivité de \mathfrak{R} .

• **Symétrie** : Soient $x, y \in \mathbb{N} : x \mathfrak{R} y$ et $y \mathfrak{R} x$. On a $\begin{cases} \exists n, m \in \mathbb{N}^*, y = nx^m; \\ \exists n', m' \in \mathbb{N}^*, x = n'y^{m'} \end{cases} \Rightarrow \exists n, n', m, m' \in \mathbb{N}^* : y = n(n'y^{m'})^m \Rightarrow \exists n, n', m, m' \in \mathbb{N}^* : y = nn'^m y^{mm'} \Rightarrow nn'^m = 1$ et $mm' = 1$. Comme $n, n', m, m' \in \mathbb{N}^*$, alors $n = n' = 1$ et $m = m' = 1 \Rightarrow$ par suite $x = y$. Donc $\forall x, y \in \mathbb{N}, x \mathfrak{R} y$ et $y \mathfrak{R} x \Rightarrow x = y$. D'où l'antisymétrie de \mathfrak{R} .

• **Transitivité** : Soient $x, y, z \in \mathbb{N} : x \mathfrak{R} y$ et $y \mathfrak{R} z \Rightarrow \begin{cases} \exists n, m \in \mathbb{N}^*, y = nx^m; \\ \exists n', m' \in \mathbb{N}^*, z = n'y^{m'} \end{cases} \Rightarrow \exists n, n', m, m' \in \mathbb{N}^* : z = n'(nx^m)^{m'} \Rightarrow \exists n, n', m, m' \in \mathbb{N}^* : z = n'n^m x^{mm'} \Rightarrow \exists n'' = n'n^m, m'' = mm' \in \mathbb{N}^* : z = n''x^{m''} \Rightarrow x \mathfrak{R} z$.

Donc $\forall x, y, z \in \mathbb{N}, x \mathfrak{R} y$ et $y \mathfrak{R} z \Rightarrow x \mathfrak{R} z$. D'où la transitivité de \mathfrak{R} . Comme \mathfrak{R} est reflexive, antisymétrique et transitive, alors \mathfrak{R} est une relation d'ordre.

2. L'ordre de \mathfrak{R} n'est pas total car si on prend $x = 3$ et $y = 5$. On a $\forall n, m \in \mathbb{N}^* : 5 \neq n3^m$ et $3 \neq n5^m$.